



Sick day drug - Medikamente bei akuten Erkrankungen

Wenn Sie sich krank fühlen oder akut krank sind, müssen manche Medikamente pausiert werden. Vor allem wenn Dehydrationsgefahr besteht – also wenn Wasser und Flüssigkeitsverluste zur Austrocknung führen können, wie zum Beispiel bei Erbrechen, starken Durchfällen, Fieber, müssen unten angeführte Medikamenten-Gruppen pausiert werden:

- › Blutdrucksenker:
 - › ACE Hemmer: Medikamente mit der Endung "pril", z. B. Lisinopril, Ramipril
 - › ARBs: Medikamente mit der Endung "sartan": z.B. Losartan, Candesartan, Valsartan
- › Schmerzmedikamente:
NSARs: z.B. Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen
- › Diuretika:
Entwässerungsmedikamente: z.B. Furosemid, Spironolacton, Indapamide
- › Antidiabetika Metformin:
Achtung in vielen Kombinationspräparaten enthalten
- › SGLT2 Hemmer:
Medikamente mit der Endung „gliflozin“ z.B. Dapagliflozin, Empagliflozin werden sowohl bei Erkrankungen des Herzens, der Niere als auch bei Diabetes eingesetzt.

Wiedereinnahme erst wenn Sie sich gut fühlen. 24-48 Stunden später, wenn eine normale Nahrungsaufnahme und Trinken wieder möglich ist. Bei eventuellen Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre betreuende Ordination.